

Pflichttext KadeFungin 3 - Fachkreis

KadeFungin® 3, Vaginaltabletten, Vaginalcreme, Kombi-Packung.

Wirkstoff: Clotrimazol.

Zus.:

1 KadeFungin 3 Vaginaltablette enth. 200 mg Clotrimazol. Sonst. Bestandt.: Adipinsäure, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), vorverkleisterte Maisstärke, Natriumhydrogencarbonat, Polysorbat 80, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure. 1 g KadeFungin 3 Vaginalcreme/Creme enth. 20 mg Clotrimazol. Sonst. Bestandt.: Benzylalkohol, Cetylpalmitat (Ph. Eur.), Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser.

Anw.:

Vaginalcreme: Entzündung der Scheide und Ausfluss, bedingt durch Pilzinfektion (*Candida albicans*), sowie Superinfektionen mit clotrimazolempfindlichen Bakterien. Vaginaltabletten: Entzündung der Scheide und Ausfluss, bedingt durch Pilzinfektion (*Candida albicans*). Kombi-Packung: Infektionen der Scheide und des äußeren Genitalbereiches durch Hefepilze (meist *Candida albicans*).

Gegenanz.:

Überempfindlichkeit gg. Clotrimazol (Vaginalcreme und Kombi-Packung zusätzlich: Benzylalkohol) od. einen der sonstigen Bestandteile.

Nebenw:

Gelegentlich: lokale Hautreizungen (z. B. Rötungen, Brennen, Stechen); bei Überempfindlichkeit: allergische Reaktionen auf der Haut; vaginale Blutungen, Häufigkeit nicht bekannt.

Vaginalcreme und Kombi-Packung zusätzlich: Benzylalkohol kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Warnhinw.:

Die Vaginalcreme/Creme enthält Benzylalkohol und Cetylstearylalkohol. Packungsbeilage beachten.

Stand: 04/2024

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin